


Information om ultraljudsundersökning och vävnadsprovtagning av prostatakörteln

Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Lund

December 2005

Utförande

Efter inledande samtal och undersökning får Du lägga Dig på vänster sida. Läkaren för in en 2 cm bred stav i ändtarmen. Detta kan kännas obehagligt, men gör sällan ont. I staven finns ultraljudssändaren. Under några minuter undersöks prostatakörteln utseende med denna. Oftast kompletteras undersökningen med vävnadsprover. Dessa tas med en tunn nål genom ultraljudsstaven. Provtagningen tar ett par minuter och känns vanligen lika lite som stick vid blodprovstagning. Det finns möjlighet att lägga lokalbedövning.



Förberedelser

Du bör ha tömt tarmen tidigare samma dag. Lavemang behövs sällan. Om vävnadsprover tas kommer Du att få ett *antibiotikum* för att minska risken för infektion. Vi använder en enda dos av tablett Ciprofloxacin 750 mg. För att Ciprofloxacin ska ha avsedd effekt bör Du två timmar före besöket inte äta eller dricka mjölkprodukter, ta syraneutraliserande läkemedel eller tabletter innehållande järn, kalk (kalcium), aluminium eller zink. Är Du allergisk mot ciprofloxacin eller något närbesläktat antibiotikum måste Du meddela oss detta när Du kommer. Du får så fall ett annat läkemedel.

Om Du har en *inopererad hjärtklaff* eller av annan anledning har hög risk att få infektion på hjärtklaffarna är det viktigt att Du får ytterligare ett antibiotikum omkring en timme före undersökningen. Vanligen har den ansvarige hjärtläkaren skrivit ut antibiotika att använda vid tandläkarbehandling som kan användas även i detta fall. Om inte, ska Du kontakta urologmottagningen i god tid före undersökningen.

Blodproppsförebyggande läkemedel ("blodförtunnande") och annan blödningsbenägenhet. Det är också viktigt för oss att få veta om Du har ökad risk för blödning i samband med provtagningen. Tar Du endera av läkemedlen Trombyl, Plavix, Ticlid, Persantin, Ilomedin, går det bra att ta vävnadsprover, men om Du tar *kombinationer* av dessa läkemedel (inklusive Asasantin) vill vi att Du kontaktar oss i god tid före undersökningen, liksom om Du tar Waran eller har blödarsjuka.

Biobankslagen

Enligt denna lag är vi skyldiga att få Ditt tillstånd för att lagra vävnadsproven mer än tre månader, separat information om detta bifogas. Önskar Du ytterligare information får Du i det vid besöket.

Komplikationer efter vävnadsprovtagning

Det är vanligt med lite blödning från ändtarmen ett par dagar efter provtagning. Rödaktig urin är vanligt en dryg vecka och missfärgad sädesvätska kan förekomma någon månad efteråt. Allt detta är ofarligt och går över av sig själv. I sällsynta fall kan större blödning förekomma, liksom infektion med feber över 38°C eller täta urinträngningar med sveda. Du bör i så fall kontakta Urologmottagningen (046 - 17 18 86, kontorstid) eller Akutmottagningen via sjukhusets växel (046 - 17 10 00).

Du är alltid välkommen att ringa om Du har några frågor.

Urologmottagningens personal

Du når oss:

måndag till torsdag kl 09.00 - 15.00,
fredag kl 09.00 - 12.30 på
046 - 17 23 70, 17 72 71 eller 17 11 61

Urologmottagningen, Universitetssjukhuset i Lund
Våning 12, Blocket