



Pneumokockvaccination - rekommendationer till BVC i Region Skåne

Från och med 1 maj 2010 har regionen inte något upphandlat pneumokockvaccin. I väntan på slutgiltigt besked vilket vaccin som kommer att upphandlas har BHV-ö-larna i maj 2010 enats om följande rekommendationer angående pneumokockvaccination:

De barn som har påbörjat vaccination med Prevenar 7 bör fullfölja sin vaccination med Prevenar 7. Anledningen till att man inte bör byta till Synflorix i en pågående vaccinationsserie är att vaccinationsskyddet barn då får är oklart. Studier saknas när det gäller vilket skydd barn får när man i ett tredosschema byter från Prevenar 7 till Synflorix.

De barn som påbörjar pneumokockvaccination, dvs ska få sin första dos, ska vaccineras med Synflorix. Antal doser och tidpunkter för vaccinationen är samma som för Prevenar 7, d v s barnen skall få Synflorix vid 3, 5 och 12 månaders ålder samtidigt som de får Pentavac eller Infanrix-Hexa. Synflorix skall ges i en dos 0,5 ml im vid de tre vaccinationstillfällena.

De barn som fått olika vaccin, Prevenar 7 och Synflorix, vid de två första vaccinationstillfällena bedömer vi rimligt att erbjuda samma vaccin vid tredje vaccinationstillfället som det som gavs vid det andra vaccinationstillfället. Någon studie som ger svar på vilket antikroppsskydd barn får efter man givit en dos Prevenar 7 och därefter två doser Synflorix finns dock ej. Synflorix ger skydd mot sjukdom orsakad av ytterligare tre pneumokockserotyper jämfört med Prevenar 7, men det är således inte vetenskapligt belagt hur skyddet blir om man blandar vaccinerna i en vaccinserie.

Medicinskt ansvar åligger som vanligt respektive BVC-läkare.

2010-05-20

BHV-ö-larna i Region Skåne
gm Lisbeth Olsson, BHV –öl Kristianstad