

Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-09-14



Ordination av blododling i eLAB RS

För att underlätta ordination av fyra flaskor samt kombinerad perifer och central provtagning: Lägg upp favoriter för perifer resp central blododling.

☐ Blododling perifer ^	☐ Blododling central ^
☐ Odling, Blod Perifert Flaska 1	☐ Odling, Blod Centralt Flaska 1
☐ Odling, Blod Perifert Flaska 2	☐ Odling, Blod Centralt Flaska 2
☐ Odling, Blod Perifert Flaska 3	☐ Odling, Blod Centralt Flaska 3
☐ Odling, Blod Perifert Flaska 4	☐ Odling, Blod Centralt Flaska 4

Vid kombinerad perifer och central provtagning: På etiketten framgår vilka flaskor som ska tas perifert resp centralt.

Testsson, Test 19 121212-1212 HGTEST	Testsson, Test 19 121212-1212 HGTEST
255702002-014 O BI FL 1 Per	316114769-014 O BI FL 1 Cen

- Fyll i relevant tilläggsinformation.
- Misstanke om brucellos eller tularemi **ska alltid anges på remissen**, då alla prover från patienten måste hanteras med högre säkerhetsnivå.
- Vid misstanke om svamp alt. protesendokardit utförs förlängd inkubationstid (14 dygn). Vid önskemål om förlängd inkubationstid av annan orsak ska laboratoriet kontaktas per telefon.

Tilläggsinformation

Allmän

Anamnes (Mikrobiologi):

Antibiotika (avslutad/pågående/planerad):

Risk för labsmitta? Se Analysportalen. (Obs! Ej resistenta bakterier/blodsmitta):

Misstanke svamp eller protesendokardit? (Blododling):

Brucellos

Tularemia

Annan smitta/patogen- ange i ana...

Avbryt

Klar

Märk flaskorna med utskrivna etiketter inför provtagning, inte med separat personnummeretikett. Täck inte över flaskans streckkod.

Bekräfta provtagning i eLAB efter genomförd provtagning.

