

Abscess Odling

Bakgrund

Odling från abscesser i inre organ peroperativt eller via punktion är en viktig diagnostisk metod för att fastställa infektiöst agens och dess antibiotikaresistens. Detta ger ledning vid antibiotikaval och kan ibland också bidra till att klarlägga varifrån de infekterande organismerna ursprungligen kommit.

Hud- och mjukdelsinfektioner, samt abscesser i inre organ kan också utgöra en källa till septisk spridning.

Svar/Tolkning/Bedömning

Växt av .../Ingen växt.

Metodik/mätprincip

Aerob och anaerob odling. Utvidgad och riktad odling utförs med ledning av remissuppgifter.

Övrig information

Adekvat frågeställning och anamnes medför bättre och adekvatare diagnostik.

Ytliga abscesser och sår i närheten av t.ex. anus, vagina och munhåla, koloniserar snabbt av normalflorabakterier från dessa organ, vilket

inte är relevant för behandlande kliniker. Det är därför väsentligt för oss att lokaliseringen av såret/abscessen anges.

Ange även klinisk information och eventuell utlandsvistelse.

Ange pågående eller planerad antibiotikabehandling för att säkerställa att resistensbestämning utförs mot medlet.

Referenslitteratur

1. Murray, P.R., Baron, E.J., Jorgensen, J.H., Tenover, M.C., Tenover, F.C. 2003. Manual of Clinical Microbiology, 7th ed. ASM Press, Washington DC, USA.
2. Mandell, G.L., Bennett, J.E., Dolin, R. 2009. Principles and Practice of Infectious Diseases, 5th ed. Churchill Livingstone Inc., New York, NY, USA.